

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ Α

Στις ερωτήσεις Α1-Α4 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α1. Ένα σώμα κάνει οριζόντια βολή από ορισμένο ύψος H πάνω από το έδαφος. Ο χρόνος που κάνει το σώμα να φτάσει στο έδαφος εξαρτάται:


- α) Από την αρχική ταχύτητα του σώματος
- β) Από το ύψος H
- γ) Από τη μάζα του σώματος
- δ) Από όλα τα παραπάνω



Μονάδες 5

Α2. Σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση σε ακτίνα R , με γωνιακή ταχύτητα ω . Ο ρυθμός μεταβολής της ορμής του ισούται με:

- α) $m\omega^2 R$
- β) $m\omega R^2$
- γ) $m\omega^2/R$
- δ) $m\omega/R^2$



Μονάδες 5

Α3. Στην ομαλή κυκλική κίνηση μένει σταθερή:

- α) η γραμμική ταχύτητα
- β) η γωνιακή ταχύτητα
- γ) η κεντρομόλος επιτάχυνση
- δ) όλα τα παραπάνω

Μονάδες 5

Α5. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη **Σωστό** αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

- α) Σε κάθε κρούση δύο σωμάτων, που αποτελούν μονωμένο σύστημα, διατηρείται η ορμή και η ενέργεια του συστήματος.
- β) Η συχνότητα της περιστροφής του ωροδείκτη είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα περιστροφής του λεπτοδείκτη.
- γ) Στην ομαλή κυκλική κίνηση η επιτάχυνση είναι μηδενική.

δ) Αν ένα σώμα βάλλεται οριζόντια και η μόνη δύναμη που του ασκείται είναι το βάρος του, η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας του αυξάνεται με σταθερό ρυθμό.

ε) Για να περιγράψουμε τις σύνθετες κινήσεις χρησιμοποιούμε την αρχή ανεξαρτησίας (ή αρχή της επαλληλίας) των κινήσεων.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Για τις μπροστινές και τις πίσω ρόδες ενός τρακτέρ ισχύει $R_1/R_2 = \frac{3}{4}$, όπου R_1 και R_2 οι ακτίνες τους. Αν N_1 και N_2 είναι ο αριθμός των περιστροφών τους αντίστοιχα για το ίδιο χρονικό διάστημα, τότε για το λόγο N_1/N_2 ισχύει:

- i) $\frac{3}{4}$
- ii) $\frac{4}{3}$
- iii) 1

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.



Μονάδες 2
Μονάδες 6

B2. Σώμα μάζας m εκτελεί οριζόντια βολή με αρχική ταχύτητα v_0 από ύψος H . Αν το ίδιο σώμα εκτελεί οριζόντια βολή με την ίδια ταχύτητα v_0 από ύψος $4H$, ο λόγος του ρυθμού μεταβολής της ορμής στην πρώτη περίπτωση, προς τον ρυθμό μεταβολής της ορμής στη δεύτερη περίπτωση είναι:

- i) 1
- ii) 2
- iii) $\frac{1}{2}$

α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Μονάδες 2
Μονάδες 6

B3. Σώμα μάζας m εκτελεί ομαλή κυκλική κίνηση με γραμμική ταχύτητα v . Το μέτρο της μεταβολής της ορμής του σώματος για χρονικό διάστημα $T/4$, όπου T η περίοδος είναι:


- i) $2mv$
- ii) $mv\sqrt{2}$
- iii) 0

- α) Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση.
- β) Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

**Μονάδες 2
Μονάδες 7**

ΘΕΜΑ Γ

Σώμα μάζας m αφήνεται στη θέση A ενός λείου, τεταρτοκυκλίου ακτίνας $R = 5$ m όπως φαίνεται στο σχήμα. Το σημείο A απέχει ύψος $H = 20$ m από το έδαφος.



Γ1. Ποια ταχύτητα έχει το σώμα όταν φτάνει στη θέση Γ και πόσο είναι η κάθετη δύναμη που δέχεται από το επίπεδο τότε;

Όταν το σώμα φτάσει στη θέση Γ , εγκαταλείπει το τεταρτοκύκλιο και κινείται μόνο με την επίδραση του βάρους του.

Γ2. Τι είδος κίνηση εκτελεί το σώμα και ποια είναι η εξίσωση που την περιγράφει;


Γ3. Πόσο απέχει το σώμα από το έδαφος όταν η κατακόρυφη συνιστώσα της ταχύτητας έχει ίσο μέτρο με την οριζόντια συνιστώσα της ταχύτητας;

Γ4. Αν η θέση A απέχει από το έδαφος σταθερή απόσταση H , πόση πρέπει να γίνει η ακτίνα του τεταρτοκυκλίου ώστε το βεληνεκές να γίνεται μέγιστο.

Μονάδες 6 + 6 + 6 + 7

ΘΕΜΑΔ

Δύο μικρές σφαίρες με μάζες $m_1 = m_2 = 1\text{kg}$ μπορούν να κινούνται σε κυκλικό δακτύλιο ακτίνας $R = 2\text{ m}$ που είναι ακλόνητα στερεωμένος σε λείο οριζόντιο τραπέζι, του οποίου η κάτοψη φαίνεται στο σχήμα. Οι τριβές μεταξύ των σφαιρών και του δακτυλίου είναι αμελητέες. Αρχικά η σφαίρα Σ_1 εκτελεί ομαλή κίνηση με φορά αντίθετη των δεικτών του ρολογιού και με ταχύτητα $v_1 = 4\text{ m/s}$, ενώ η σφαίρα Σ_2 είναι ακίνητη. Οι σφαίρες συγκρούονται πλαστικά. Να υπολογίσετε:



Δ1) Το μέτρο της ταχύτητας του συσσωματώματος μετά την κρούση, καθώς και το λόγο T/T' όπου T η περίοδος της περιστροφής της σφαίρας Σ_1 και T' η περίοδος περιστροφής του συσσωματώματος.

Δ2) Το μέτρο της μεταβολής της ορμής της σφαίρας Σ_1 κατά την κρούση καθώς και τη δύναμη που της ασκήθηκε, αν ο χρόνος επαφής των δύο σφαιρών είναι $\Delta t = 0,01\text{ sec}$.

Δ3) Την απώλεια της μηχανικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της πλαστικής κρούσης.

Δ4) Αλλάζοντας το υλικό των σφαιρών αλλά διατηρώντας τις μάζες τους, τα σφαιρίδια συγκρούονται χωρίς να δημιουργηθεί συσσωμάτωμα. Αν η κινητική ενέργεια του συστήματος των δύο σφαιρών διατηρείται σταθερή κατά την κρούση, να βρείτε σε πόσο χρόνο μετά την πρώτη φορά θα συγκρουστούν για δεύτερη φορά.

Μονάδες 6 + 6 + 6 + 7

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΑ

A1. β, A2. α, A3. β, A4. γ

A5. α) Σωστό, β) Λάθος, γ) Λάθος, δ) Σωστό, ε) Σωστό

ΘΕΜΑ Β

B1.

α) ii


β) Οι γραμμικές ταχύτητες είναι ίδιες και στις δύο ρόδες.

$$v_1 = v_2 \Rightarrow 2\pi R_1 f_1 = 2\pi R_2 f_2 \Rightarrow \frac{F_1}{F_2} = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{\frac{N_1}{\Delta t}}{\frac{N_2}{\Delta t}} = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{N_1}{N_2} = \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \frac{N_2}{N_1} = \frac{4}{3}$$

B2.

α) i β) Ρυθμός μεταβολής της ορμής : $\frac{\Delta p}{\Delta t} = \Sigma F = B = mg$


$$\left| \frac{\Delta p}{\Delta t} \right|_1 = \left| \frac{\Delta p}{\Delta t} \right|_2 \Rightarrow \frac{\left| \frac{\Delta p}{\Delta t} \right|_1}{\left| \frac{\Delta p}{\Delta t} \right|_2} = 1$$




B3.

α) i

β) Σε χρόνο $T/4$ πηγαίνει από τη θέση (1) στη θέση (2)



ΘΕΜΑ Γ



Γ1.

Θεώρημα Μεταβολής Κινητικής Ενέργειας για τις θέσεις Α και Γ.

$$K_{\Gamma} - K_A = W_B + W_N \Rightarrow K_{\Gamma} = W_B \Rightarrow \frac{1}{2}mv^2 = mgR$$

$$v = \sqrt{2gR} = \sqrt{2 \cdot 10 \cdot 5} = 10 \text{ m/s}$$

Θέση Γ:

$$\Sigma F_B = F_K \Rightarrow N - B = \frac{mv^2}{R} \Rightarrow N = mg + \frac{mv^2}{R} \Rightarrow N = 2 \cdot 10 + \frac{2 \cdot 100}{5} = 20 + 40 = 60 \text{ N}$$

Γ2. Αφού το σώμα έχει στη θέση Γ οριζόντια ταχύτητα $v = 10 \text{ m/s}$ και η μόνη δύναμη που του ασκείται είναι το βάρος του, εκτελεί οριζόντια βολή με ταχύτητα $v_0 = 10 \text{ m/s}$.

Στον άξονα x' : $x = v_0 t$

$$y = \frac{g}{2} v_0^2 x \Rightarrow y = \frac{10}{2 \cdot 10^2} x^2 \Rightarrow y = \frac{x^2}{20} (\text{SI})$$

Στον άξονα y' : $y = \frac{1}{2} g t^2$

Γ3.

$$v_x = v_y \Rightarrow v_0 = gt \Rightarrow t = \frac{v}{g}$$

$$t = 1 \text{ sec}$$

$$y = \frac{1}{2} g t^2 = 5$$

Απέχει από το έδαφος $h = H - R - y = 20 - 5 - 5 = 10 \text{ m}$

Γ4. Βεληνεκές $S = v_0 t$

$$\left. \begin{array}{l} 1 \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gR} \\ H - R = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{2\frac{(H-R)}{g}} \end{array} \right\} \Rightarrow 4R^2 - 4HR + S^2 = 0$$

$$\Delta = 16H^2 - 16S^2 \geq 0 \Rightarrow S \leq H \text{ αρα } S_{\max} = H$$

H πιο πάνω εξίσωση γίνεται : $4R^2 - 4HR + H^2 = 0$

$$\Delta = 0 \quad R = 4 \frac{H}{8} = \frac{H}{2} = 10 \text{ m}$$

ΘΕΜΑ Δ

Δ1) Εφαρμόζουμε την αρχή διατήρησης της ορμής στην κρούση των δύο σφαιρών αφού αποτελούν μονωμένο σύστημα σωμάτων.

$$\vec{p}_{\nu\pi\nu} = \vec{p}_{\mu\epsilon\alpha} \Rightarrow m_1 \cdot v_1 = (m_1 + m_2) V \Rightarrow V = \frac{v_1}{2} \Rightarrow V = 2 \text{ m/s}$$

$$\left. \begin{array}{l} v_1 = 2 \frac{\pi R}{T} \Rightarrow T = 2 \frac{\pi R}{v} \\ V = 2 \frac{\pi R}{T'} \Rightarrow T' = 2 \frac{\pi R}{V} \end{array} \right\} \frac{T'}{T} = \frac{V}{v} \Rightarrow \frac{T'}{T} = \frac{1}{2}$$

Δ2.

$$\Delta \vec{p}_1 = \vec{p}_{1,\nu\lambda} - \vec{p}_{1,\mu\epsilon\alpha} \Rightarrow \Delta p_1 = m_1 \cdot V - m_1 \cdot v_1$$

$$\Delta \vec{p}_1 = 2 - 4 = -2 \text{ kgm/s}$$

$$|\Delta p_1| = 2 \text{ kgm/s}$$

$$F_2 \rightarrow_1 = \frac{\Delta p_1}{\Delta t} = \frac{2}{0,01} = 200 \text{ N}$$

Δ3.

$$E_{\sigma\pi\omega\lambda} = K_{o\lambda,\nu\pi\lambda} - K_{o\lambda,\mu\epsilon\alpha} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2 - \frac{1}{2} (m_1 + m_2) V^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 - 4^2 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 = 8 - 4 = 4 \text{ J}$$

Δ4.

$$\Delta \Delta O: \vec{p}_{o\lambda,\nu\pi\nu} = \vec{p}_{o\lambda,\mu\epsilon\alpha} \Rightarrow m_1 v_1 = m_1 v_1' + m_2 v_2' \Rightarrow v_1 - v_1' = v_2' \quad (1)$$

$$K_{o\lambda,\nu\pi\nu} = K_{o\lambda,\mu\epsilon\alpha} \Rightarrow \frac{1}{2} m_1 v_1^2 = \frac{1}{2} m_1 v_1'^2 + m_2 v_2'^2 \Rightarrow v_1^2 - v_1'^2 = (v_1^2 + v_1'^2) - (v_1^2 + v_1'^2) = v_2' \quad (2)$$

Σελίδα 7 από 8

Διαιρώντας κατά μέλη τις σχέσεις $\textcircled{1}, \textcircled{2} \Rightarrow v_1 + v_1' = v_2' \textcircled{3}$

$$\left. \begin{array}{l} \textcircled{1} \quad \textcircled{3} \\ v_1 - v_1' = v_2' \\ v_1 + v_1' = v_2' \end{array} \right\} \quad \begin{array}{l} v_1' = 0 \\ v_2' = v_1 = 4 \text{ m/s} \quad (\text{ανταλλάσσουν ταχύτητες}) \end{array}$$

Άρα η σφαίρα Σ_1 ακινητοποιείται στη θέση που έγινε η κρούση.

Οι δύο σφαίρες θα συγκρουστούν ξανά όταν η σφαίρα Σ_2 διαγράφει μια πλήρη περιστροφή και φτάσει ξανά τη σφαίρα Σ_1 .

Άρα $\Delta t = T_2$

$$v_2' = 2 \frac{\pi R}{T_2} \Rightarrow T_2 = 2 \frac{\pi R}{v_2'} = 2 \frac{\pi \cdot 2}{4} = \pi = 3,14 \text{ sec}$$

Επιμέλεια θεμάτων
Μαρία Τάντου